

Помните!

Риск заражения ВИЧ при внутривенном введении наркотиков очень велик: равен более 90%, при незащищенном сексуальном контакте с ВИЧ-инфицированным партнером – до 20%.

Среди зарегистрированных наркопотребителей инфицированы ВИЧ более 60%, что в 30 раз превышает пораженность среди остального населения



Профилактика:

- во время инъекций используйте только одноразовые или стерильные шприцы и иглы;
- при проникающих половых контактах, особенно со случайными партнерами, всегда используйте презерватив



Заразиться ВИЧ при употреблении наркотиков можно:

- через внутривенное введение наркотических средств с использованием нестерильных инструментов;
- через проникающие сексуальные контакты без использования презерватива;



Уменьшить риск заражения ВИЧ при парентеральном введении любого препарата можно:

- - используя при каждом введении препарата новый, ранее никем не использованный шприц и иглы, или только свой «персональный» шприц и иглу, которыми никто более не пользовался;
- - используя при введении препарата шприц и иглу, прошедшую предварительную обработку длительным кипячением или дезинфицирующими

Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти 3 путями:

- через кровь,
- при половых контактах без презерватива,
- от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку

Свойства вируса

ВИЧ очень чувствителен к высокой температуре:

- > при +56С погибает через 30 минут;
- > при 100С — практически мгновенно;



Уменьшить риск заражения ВИЧ при парентеральном введении любого препарата можно:

- - используя для введения раствор препарата, приготовленного в условиях, исключающих попадание крови другого лица;
- - кипячением раствора препарата непосредственно перед введением, не промывая свой индивидуальный шприц в одной емкости со шприцами, использованными другими людьми.



Употребление наркотиков не является
противопоказанием к назначению
терапии, но лечение будет более
успешным, если к началу момента
приема АРВИ
Вы сможете отказаться от употребления
наркотиков (возможно с помощью
врачей-наркологов)

**Раннее выявление ВИЧ-
инфекции увеличит шансы на
успешное лечение. Которое
поможет сохранить
здоровье и хорошее
самочувствие:**

- антиретровирусная терапия (АРВИ), продлевает жизнь на долгие годы и значительно улучшает ее качество
- И если вирусная нагрузка снижена до неопределяемой, то риск передачи ВИЧ снижается на 96%.



Важно!

Полезный совет для тех, кто принимает АРВИ:

1. Обязательно возьмите у врача-инфекциониста справку о том, что вы являетесь пациентом Центра-СПИД и вам необходимо принимать терапию по жизненным показаниям в строго установленном время без пропусков.
2. Помните, что справка действительна при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт, водительское удостоверение и др.)

ВИЧ+ЛЕЧЕНИЕ=ЖИЗНЬ

Помните!
Пропуск приема препаратов снижает
эффективность лечения.



**Где можно сдать анализ на ВИЧ:
ГБУЗ КО Областной Центр-СПИД
г. Кемерово, пр. Ленина, 121 «Б» или в
Центрах-СПИД или по месту жительства**

**Телефон доверия по ВИЧ/СПИД:
78-03-30
сайт: www.kemspid.ru**



**Если Вы употребляете наркотики,
но для Вас значима ценность жизни,
то этот буклет для вас.**

**Уловным кодексом Российской Федерации,
действующем с 1 января 1997 года,
статья 122 предусмотрена ответственность
за заражение ВИЧ-инфекцией:**

- заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывалось ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
- заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, зная или имея намерение у него этой болезнью, наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет.
- деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывалось лишением свободы на срок до трех лет.